

תרגיל ראשון

(הגשה: 21.2.2008)

סימולציה של פרמוטציה

מנסים להגריל פרמוטציה מקרית של $\{1, \dots, n\}$ באופן הבא: ראשית שומרים במשתנים x_1, \dots, x_n את הערכים $x_i = i$ לכל $1 \leq i \leq n$. אחר כך מבצעים n שלבים, כאשר בשלב ה- i בוחרים באופן יוניפורמי $1 \leq j \leq n$, ומחליפים את הערכים $x_i = x_j$ (אם נבחר $j = i$ אז לא עושים כלום). האם בסוף התהליך אכן תוגרל באופן יוניפורמי מכל האפשרויות פרמוטציה של $\{1, \dots, n\}$? נמקו.

סכום מקרי

נניח ש- $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ היא סידרה של מספרים שכל מה שידוע עליהם הוא שלא כולם שווים ל-0. נגריל עתה מספר r באופן הבא: נבחר באופן מקרי ויוניפורמי (מכל הקבוצות האפשריות) תת קבוצה $I \subseteq \{1, \dots, n\}$, ואז נקבע את $r = \sum_{i \in I} \alpha_i$. הראו שבסיכוי $\frac{1}{2}$ לפחות r אינו שווה ל-0.

ניחושים מול שקרן

קיים מספר טבעי לא ידוע k שאותו צריך לנחש (אין מראש הגבלה על גודלו). השאלה היחידה שמותר לשאול היא מהסוג "האם המספר שווה ל- a ?" כאשר a מספר טבעי כל שהוא. אם $a \neq k$ אז התשובה תמיד תהיה "לא", אבל אם $a = k$ אז רק בסיכוי $\frac{2}{3}$ התשובה תהיה "כן", ובסיכוי $\frac{1}{3}$ התשובה בכל זאת תהיה "לא". כתבו אלגוריתם אשר יצליח למצוא את המספר הנכון (ז"א לקבל תשובה של "כן") לאחר ביצוע מספר ניחושים שתוחלתו היא $O(k)$ לכל k , והוכיחו זאת.

תרגיל שלישי

(הגשה: 18.5.2008)

הילוך מקרי על הקוביה

על הקוביה הבוליאנית $\{0, 1\}^n$ נגדיר הילוך מקרי מהראשית: $\underline{x}^{(0)}$ יהיה הווקטור שכולו אפסים, ובהינתן $\underline{x}^{(i)}$, נגדיר את $\underline{x}^{(i+1)}$ ע"י זה שנבחר באופן יוניפורמי (וב"ת בבחירות קודמות) $1 \leq j_i \leq n$, ואז נהפוך את ערכו של האיבר ה- j_i ב- $\underline{x}^{(i)}$. נסמן ב- d_i את המרחק מהראשית של $\underline{x}^{(i)}$, ז"א את מספר האחדות שבו. הראו שמתקיים:

$$\Pr\left[d_n < \frac{1}{2}E[d_n]\right] \leq 2^{-\Omega(n)}$$

הערה: אפשר לפתור זאת מבלי לחשב במדויק את $E[d_n]$, אבל כמובן שצריך לדאוג לאיזה שהוא חסם על גודל התוחלת הנ"ל.

פונקציות מונוטוניות מקריות

עבור ווקטורים בקוביה הבוליאנית $\{0, 1\}^n$, $\underline{x}, \underline{y} \in \{0, 1\}^n$ נרשום $x \leq y$ אם לכל i מתקיים $x_i \leq y_i$. פונקציה $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ תיקרא מונוטונית אם לכל $\underline{x} \leq \underline{y}$ מתקיים $f(\underline{x}) \leq f(\underline{y})$. נניח עתה ש- f היא פונקציה מונוטונית המוגרלת באופן יוניפורמי מקבוצת כל הפונקציות המונוטוניות (שימו לב שבמרחב הסתברות זה אין אי תלות של ערכי $f(\underline{x})$ זה בזה). הוכיחו עתה שלכל $\underline{y}, \underline{z} \in \{0, 1\}^n$ מתקיים:

$$\Pr[f(\underline{y}) = 1 \wedge f(\underline{z}) = 1] \geq \Pr[f(\underline{y}) = 1] \cdot \Pr[f(\underline{z}) = 1]$$

שתי שאלות על הילוכים מקריים מהוססים

גמרו לקרוא את החומר על הילוכים מקריים.

עתה, נניח שאנו מבצעים (במקום הילוך מקרי רגיל) את הפרוצדורה הבאה: בכל שלב, בסיכוי חצי נבצע את ההילוך המקרי לפי בחירה של שכן מקרי של הצומת הנוכחי, ובסיכוי חצי פשוט נישאר צעד אחד נוסף בצומת הנוכחי. נניח גם שהגרף עליו מתבצע ההילוך הוא קשיר. הוכיחו עבור הילוך כזה שני דברים.

- הילוך כזה תמיד יתכנס להתפלגות הסטצינרית (אותה אחת כמו עבור הילוך מקרי רגיל), גם אם הגרף הוא 2-צביע.
- זמני הביקור (הממוצעים) בהילוך כזה הם בדיוק כפולים מאלו של הילוך מקרי רגיל.

הערה: כל סעיף כאן ינוקד כאילו הוא שאלה נפרדת.